


Возможные клинические проявления и симптомы у детей с врожденной ЦМВИ



Врожденная цитомегаловирусная инфекция – инфекционное заболевание, развившееся в результате антенатальной передачи возбудителя от матери к плоду при первичном заражении беременной, реактивации ранее приобретенной инфекции во время беременности или заражении серопозитивной беременной другим штаммом цитомегаловируса.

Клинические проявления и симптомы

- Малый вес для гестационного срока (масса тела при рождении < - 2 SD для ГВ)
- Микроцефалия (окружность головы < - 2 SD для ГВ)
- Петехии или пурпура (выявляются в течение первых часов после рождения и могут персистировать несколько недель)
- Сыпь по типу «черничного кекса» (внутрикожный гематопозз)
- Желтуха (ЦМВ-ассоциированная: появляется в первые сутки после рождения и персистирует дольше физиологической)
- Гепатомегалия
- Спленомегалия
- Неврологические симптомы (угнетение безусловно рефлекторной деятельности, вплоть до комы, слабо вызываемые рефлексы)
- Судороги

Изменения при лабораторных и инструментальных исследованиях

- Анемия
- Тромбоцитопения (отмечается на первой неделе жизни, спонтанно восстанавливается после 2 недели жизни)
- Лейкопения, изолированная нейтропения
- Повышение уровня трансаминаз (аланин- и/или аспартатаминотрансфераза)
- Конъюгационная гипербилирубинемия
- Патологические индексы в ликворе (повышения уровня белка, плеоцитоз), положительная ЦМВ ДНК.
- Нейровизуализационная картина: кальцификаты, перивентрикулярные кисты, вентрикулодилатация, субэпиндимальные кисты, аномалии белого вещества, атрофия коры, нарушение миграции серого и белого вещества, гипоплазия мозжечка, лентикюлостриарная васкулопатия
- Нейросенсорная тугоухость вплоть до глухоты одно- или двусторонняя
- Патология со стороны органа зрения: хориоретинит, ретинальные кровоизлияния, атрофия зрительного нерва, катаракта, косоглазие

Примечание. SD – стандартное отклонение, ГВ – гестационный возраст, ЦМВ - цитомегаловирус