

Дифференциальная диагностика переднего и заднего медиастинита

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ	МЕДИАСТИНИТ	
	ПЕРЕДНИЙ	ЗАДНИЙ
Пульсирующая боль	Возникает за грудиной	Локализуется в груди и иррадиирует в межлопаточную область
Усиление боли	А. При поколачивании по грудине. Б. При наклоне головы (симптом Герке)	А. При надавливании на остистые отростки грудных позвонков. Б. При глотании и вдохе (симптом Ридингера)
Пастозность	В области грудины	В области грудных позвонков
Появление припухлости	В яремной впадине	Над ключицей
Появление крепитации	В яремной впадине	Над ключицей
Втягивание области яремной впадины при вдохе (югулярный симптом Равич-Щербо)	Характерно	Не характерно
Появление ригидности минных мыши (паравертебральный симптом Равич-Щербо и Штейнберга)	Не характерно	Характерно
Симптомы славления	Верхней полой вены (головная боль, шум в ушах, цианоз лица, шеи, расширение вен шеи, груди)	Главным образом непарной и полунепарной вен (расширение межреберных вен, появление выпота в плевре, перикарде)
Расширение границ притупления	В области грудины	В обе стороны от нижних грудных позвонков

Источник: Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. - 600 с.