



Дифференциально-диагностические критерии острых респираторных вирусных инфекций у детей

Признаки	Грипп	Парагрипп	Аденовирусная инфекция	РС-инфекция	Риновирусная инфекция	Реовирусная инфекция
Возбудитель	Вирусы гриппа: 3 серотипа (А, В, С)	Вирусы парагриппа: 5 серотипов (1–5)	Аденовирусы: 49 серотипов (1–49)	РС-вирус: 1 серотип	Риновирусы: 114 серотипов (1–114)	Реовирусы: 3 серотипа (1–3)
Возраст	Различный	Чаще 6 мес – 5 лет	Чаще 6 мес – 5 лет	Чаще 1–2 года	Различный	Чаще 6 мес – 3 года
Начало заболевания	Острейшее	Острое	Острое	Постепенное	Острое	Острое
Ведущий клинический синдром	Интоксикация	Катаральный	Катаральный	Дыхательная недостаточность	Катаральный	Катаральный
Синдром интоксикации	Сильно выражен, продолжается 2–5 дней	Умеренно или слабо выражен, продолжается 3–5 дней	Умеренно выражен, продолжается 5–14 дней	Слабо выражен, продолжается 3–7 дней	Слабо выражен, продолжается 1–2 дня	Слабо или умеренно выражен, продолжается 1–3 дня
Температура тела	39°С и выше	37–38° С	38–39°С	Субфебрильная, иногда нормальная	Нормальная или повышенная	Субфебрильная или нормальная
Катаральный синдром	Умеренный, со 2–3-го дня болезни; экссудативный компонент выражен слабо	Выраженный, с первого дня болезни; экссудативный компонент умеренный	Сильно выражен, с первого дня болезни	Выражен, постепенно нарастает	Выражен, с первого дня болезни	Умеренно выражен, с первого дня болезни
Ринит	Заложенность носа, затруднение носового дыхания	Легкая заложенность носа, умеренное серозное отделяемое	Обильное слизисто-серозное отделяемое; носовое дыхание резко затруднено	Необильное серозное отделяемое	Обильное серозное отделяемое; носовое дыхание затруднено или отсутствует	Умеренное серозное отделяемое
Кашель	Сухой, мучительный, болезненный	Грубый «лающий»	Влажный	Спастический	Покашливание	Редкое покашливание
Изменения в ротоглотке	Умеренная, синюшная гиперемия, зернистость задней стенки глотки; инъекция сосудов слизистой оболочки зева	Слабая или умеренная гиперемия, зернистость задней стенки глотки	Умеренная гиперемия, отечность слизистой оболочки глотки и небных миндалин с нежным белесоватым налетом; гиперплазия фолликулов задней стенки	Слабая гиперемия слизистых оболочек	Слабая гиперемия слизистых оболочек	Слабая или умеренная гиперемия слизистых оболочек
Ведущий синдром поражения респираторного тракта	Трахеит	Ларингит	Назофарингит изолированный или в сочетании с тонзиллитом, конъюнктивитом	Бронхиолит	Ринит	Назофарингит
Увеличение лимфатических узлов	Отсутствует	Отсутствует	Увеличены шейные, п/челюстные и мезентериальные л/у	Отсутствует	Отсутствует	Увеличены шейные лимфатические узлы
Увеличение печени и селезенки	Отсутствует (может быть при токсикозе)	Отсутствует	Отмечается	Отмечается	Отсутствует	Отмечается
Поражение глаз	Инъекция сосудов склер	Отсутствует	Конъюнктивит различной формы, кератоконъюнктивит	Отсутствует	Инъекция сосудов конъюнктив и склер; обильное слезотечение	Инъекция сосудов склер; иногда катаральный конъюнктивит
Течение	Острое	Острое	Затяжное, волнообразное; латентное с персистенцией вирусов	Острое	Острое	Острое
Продолжительность болезни	До 7–10 дней	7–14 дней	2–4 нед и более	7–10 дней	5–7 дней	2–4 нед и более