

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОТРОФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

| Признаки | Степень тяжести | | |
|---|---|--|--|
| | I степень (легкая форма) | II степень (средней тяжести) | III степень (тяжелая) |
| Соотношение массы и длины тела | P25–P10 | P10–P3 | Ниже P3 |
| Трофическое нарушение кожи | Умеренно бледная, со сниженной эластичностью | Бледная, сухая, шелушащаяся | Морщинистая, бледная, с пластинчатым шелушением, трещины |
| Истончение подкожного жирового слоя | Умеренное | Отчетливое, умеренно контурируются ребра, суставы | Значительное, отчетливо контурируются ребра, суставы |
| Снижение тургора тканей | Умеренное | Значительное, дряблые складки кожи на конечностях, шее | Резкое, складки кожи на ягодицах, лице, туловище |
| Изменение функционального состояния | Умеренное | Гипорефлексия, мышечная гипотония | Выраженная гипорефлексия, мышечная дистония |
| Нарушение состояния гомеостаза | Увеличение гематокритного числа, гипогликемия, гипокальциемия | Повышение нервно-рефлекторной возбудимости | — |
| Изменение иммунологической реактивности | Дисиммуноглобулинемия, снижение содержания IgG и функциональной активности лимфоцитов и нейтрофилов | — | — |