


Анафилактический шок

NB! Анафилактический шок – острая недостаточность кровообращения, проявляющаяся снижением систолического артериального давления (АД) ниже 90 мм рт. ст. или на 30% от рабочего уровня [1] и приводящая к гипоксии жизненно важных органов [2].

Алгоритм ведения пациента с анафилактическим шоком



Источники

1. Sampson H, Munoz-Furlong A, Campbell R et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: Summary report – Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol 2006; 117 (2): 391–7. DOI: 10.1016/j.jaci.2005.12.1303
2. Анафилактический шок. В кн.: Аллергология. Федеральные клинические рекомендации. М.: Фармарус Принт Медиа, 2014. С. 35–47.
3. Soar J, Pumphrey R, Cant A et al. Emergency treatment of anaphylactic reactions – Guidelines for healthcare_3_2020_job.indd 23 14.10.2020 11:07:05 24 providers. Resuscitation 2008; 77 (2): 157–69. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2008.02.001
4. Shaker M, Wallace D, Golden D et al. Anaphylaxis – a 2020 practice parameter update, systematic review, and Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) analysis. J Allergy Clin Immunol 2020. DOI: 10.1016/j.jaci.2020.01.017