

Дифференциальная диагностика энуреза



Недержание мочи (инконтиненция)	Непроизвольное мочеиспускание в неподходящем времени и месте у ребенка в возрасте ≥ 5 лет. Включает в себя как энурез, так и дневное недержание мочи. В данном заявлении термин "недержание" относится к периодическому (не непрерывному).
Симптомы нижних мочевыводящих путей	Гетерогенная группа симптомов, связанных с мочеиспусканием, включающая в себя: <ul style="list-style-type: none">● Полиурию (≥ 8 раз в день) или олигурию (≤ 3 раз в день)● Отложенное мочеиспускание, маневры, связанные с удержанием мочи● Дневное недержание мочи● Ургентное недержание мочи или дизурия (без инфекции мочевыводящих путей)● Прерывистое мочеиспускание● Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря
Моносимптомный энурез	Энурез без симптомов нижних мочевыводящих путей
Немоносимптоматический энурез	Энурез и любой из показателей симптомов нижних мочевыводящих путей
Первичный энурез	Относится к детям, никогда не контролировавшим мочеиспускание в ночное время
Вторичный энурез	Указывает на ребенка, у которого до энуреза был «сухой» период продолжительностью > 6 месяцев. Часто ассоциируется с психологическими или физическими сопутствующими заболеваниями
Ожидаемая емкость мочевого пузыря (ОЕМП)	Формула объема: $30 + (\text{возраст (лет)} \times 30)$ до 12 лет. У взрослого человека объем мочевого пузыря составляет около 400 мл. <65% от ОЕМП соответствует малой емкости мочевого пузыря >130% от ОЕМП за ночь соответствует ночной полиурии