

Укус насекомого-что делать?

К жалящим насекомым относятся пчелы, осы, шершни, шмели, оводы.



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- ⊗ Шок – один из самых опасных симптомов! Проявляется в виде «мушек» перед глазами, головокружении, тошноте
- ⊗ Укусы в рот или глаз гораздо более опасны, чем укусы в другие части тела.
- ⊗ Наиболее опасны укусы в горло после того, как ребенок проглотил или вдохнул насекомого. Отек дыхательных путей опасен даже при отсутствии аллергической реакции.
- ⊗ Чем меньше времени проходит от момента укуса до развития симптомов, тем менее благоприятен прогноз.



Обычные реакции: кратковременная боль, краснота вокруг места укуса, зуд, повышение местной температуры.



Красные флаги: покраснение кожи, крапивница, ограниченный отек губ, языка, першение в горле, одышка, колики в животе, понос.



Угрожающие признаки: серовато-голубоватый цвет кожи, судороги, потеря сознания, невозможность дышать из-за отека дыхательных путей

ЧТО ДЕЛАТЬ

- 1 Осмотрите место укуса и убедитесь, что в коже не осталось жала, которое может остаться только после укуса пчелы. При необходимости удалите жало, так как из него в течение 2–3 минут после укуса продолжает выделяться яд. Подденьте жало ногтем или лезвием ножа, ножниц; не сдавливайте пальцами выступающий над кожей конец жала.
- 2 Промойте укус водой с мылом.
- 3 Приложите на 15–20 минут пакет со льдом, чтобы замедлить всасывание яда и уменьшить боль.
- 4 Для уменьшения боли и зуда используйте парацетамол в возрастной дозировке. При раннем применении устранить местные симптомы могут антигистаминные препараты. Проконсультируйтесь со специалистом о дозировке и предпочтительном препарате.