

2025 Прививки для детей в России



В роддоме	1 мес	2 мес	3 мес	4,5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	6–7 лет	11 лет	14 лет	
БЦЖ ВГВ	ВГВ	ПКВ Пентаксим	НiВ ИПВ АКДС	НiВ ИПВ АКДС ПКВ	ВГВ НiВ ИПВ АКДС	Инфанрикс гекса		ПКВ	НiВ ИПВ АКДС	БОПВ	БОПВ АДСм или Адасель		АДСм или Адасель	
					Грипп (ежегодно)¹									
							КПК				КПК			

↑↑↑ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ↑↑↑

↓↓↓ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ↓↓↓



Здоровым детям нет необходимости сдавать анализы крови или мочи перед прививкой



Ждете ребенка?
Чтобы защитить вас и вашего малыша от коклюша – получите вакцину Адасель (Tdap). Ее рекомендуется вводить с 27 по 36 недель беременности. Подробности узнайте у лечащего врача.

Оранжевые прямоугольники указывают на возрастной диапазон, когда должна быть введена прививка.

Примечания:

1. Две дозы с интервалом 4 недели, если ребенок до 9 лет получает вакцину впервые, затем каждую осень по 1 дозе.
2. МепВ (Vexsero) вводится по схеме 3+1, 2+1 или 1+1, в зависимости от возраста.
3. HPV вводится с 9 до 15 лет двукратно (интервал 6 мес), или после 15 лет трехкратно (схема 0–2–6 мес).
4. МепACWY (Менактра) вводится двукратно с 9 месяца жизни (интервал 3 месяца), либо после 2 лет однократно.

Вакцина против клещевого энцефалита (Tick-Borne Encephalitis – TBE) применяется для эндемичных регионов, по согласованию с педиатром. Схема вакцинации: 1-я доза по назначению, 2-я через 1–3 мес, 3-я через 5–12 мес.

Если у ребенка есть какие-либо заболевания, которые создают риск инфекции, или он покидает территорию России – поговорите с педиатром о дополнительных прививках, которые могут понадобиться.

Обратите внимание: Если ваш ребенок пропустил прививку, вам не нужно начинать все с начала – приходите на следующий приём к своему врачу.

БЦЖ (BCG) – вакцина против туберкулёза

ВГВ (Hep B) – вакцина против вирусного гепатита В

ИПВ (IPV) – инактивированная полиомиелитная вакцина БОПВ (OPV) – бивалентная оральная полиомиелитная вакцина

ПКВ (PCV) – пневмококковая конъюгированная вакцина

НiВ – вакцина против гемофильной инфекции типа В RotaV – вакцина против ротавируса

АКДС (DTaP) – адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина

Адасель (Tdap) – вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка для школьников и взрослых

АДСм (Td) – вакцина против столбняка и дифтерии КПК (MMR) – вакцина против кори, паротита, краснухи

МепACWY – вакцина против менингококковой инфекции групп А,С,W,Y

МепВ – вакцина против менингококковой инфекции группы В

HPV – вакцина против папилломавируса человека

Использованы материалы CDC:

