


Что делать, если ребёнок укололся шприцем на улице?

- ➔ Сохраняйте спокойствие, не паникуйте и не ругайте ребёнка.
- ➔ Промойте место укола под проточной водой с мылом.
- ➔ Не трите и не выдавливайте кровь из раны.
- ➔ Обработайте рану антисептиком (избегайте спиртосодержащих средств, чтобы не повредить ткани).
- ➔ Обратитесь за медицинской помощью (травмпункт, приемное отделение)



Анализы и наблюдение

- ➔ ВИЧ: Проведение тестов на антитела через 6 недель и повторно через 3–12 месяцев.
- ➔ Гепатит В: если ребёнок привит, риск минимален. При сомнениях — анализ на уровень антител (Anti-HBsAg).
- ➔ Гепатит С: Анализ на антитела через 6 недель и повторно через 3–12 месяцев.
- ➔ Столбняк: Проверьте актуальность прививки. При необходимости — экстренная профилактика.

Как избежать подобных ситуаций?

- Объясните ребёнку опасность контакта с иглами и шприцами.
- Научите его сообщать взрослым о находках подозрительных предметов.
- Храните лекарства и острые предметы в недоступных для детей местах.
- Правильно утилизируйте использованные иглы и шприцы, помещая их в непрокалываемые контейнеры.