

Дифференциальная диагностика вирусных экзантем у детей

Инфекция	Характеристика и сроки появления сыпи (от начала заболевания)	Продолжительность высыпаний	Локализация и этапы высыпаний	Эволюция сыпи	Отличительный симптом	Общее состояние	Осложнения
Ветряная оспа	1-2 день; везикулезная на неизменном фоне	5-7 дней	Определенной локализации нет	Пятно, везикула, корочка	Сыпь на волосистой части головы	Субфебрилитет; обычно состояние не нарушено	Стеноз гортани; энцефалит; менингоэнцефалит
Корь	4-5 дней; пятнисто-папулезная, склонная к сливанию на неизменном фоне.	3-4 дня;этапность	1-й день-на лице; 2й день-на туловище и верхних конечностях; 3-й день-на нижних конечностях.	Мелкое, отрубевидное шелушение, пигментация в течение 2-3 недель	Пятна Филатова-Бельского-Коплика на слизистой оболочке полости рта	Лихорадка; конъюнктивит; ринит; кашель; головная боль	Стеноз гортани, менингоэнцефалит, пневмония
Краснуха	1-2 день; мелкопятнистая, розовая на неизменном фоне	1-2 дня; одно-моментно	По всей коже, больше на разгибательных поверхностях конечностей, спине,ягодицах	Исчезает бесследно	Увеличение латеральных шейных и затылочных лимфатических узлов	Субфебрилитет; обычное состояние не нарушено	Стеноз гортани; менингоэнцефалит; энцефалит
Скарлатина	1-2 день; мелко-точечная сыпь на фоне гиперемии	одномоментно	На внутренних поверхностях конечностей, в складках, на боковых поверхностях туловища	Пластинчатое шелушение на ладонях и стопах, отрубевидное-на лице и туловище; исчезает бесследно	Треугольник Филатова-отсутствие сыпи на носу, губах, подбородке	Лихорадка; головная боль; интоксикация;ангина	Миокардит; гломерулонефрит; артрит
Псевдотуберкулез Иерсиниоз	В разные сроки от 1 до 21 дня и позднее; полиморфная сыпь на фоне легкой гиперемии	Одномоментно; с подсыпанием	Везде, определенной этапности нет	Пластинчатое шелушение на ладонях и стопах, отрубевидное-на лице и туловище; исчезает бесследно	Симптомы «перчаток», «носков»	Лихорадка; головная боль;боль в животе; артралгии; интоксикация; гепатит	Артриты; менингоэнцефалит;гломерулонефрит; патология со стороны ЖКТ
Инфекционный мононуклеоз	Сыпь может отсутствовать; сроки высыпания неопределенные; полиморфная сыпь, иногда геморрагическая	Несколько дней	Определенной локализации нет, может быть частичная пигментация	Мелкое шелушение		Состояние значительно нарушено: лихорадка, боль в горле, заложенность носа	Менингоэнцефалит; цитопении; судороги; с-м Гийена-Барре
Менингококкемия	С первых часов болезни; пятнисто-папулезная, геморрагическая, «звездчатая», иногда с некрозом в центре, сливная	Быстрое нарастание	Опереденной локализации нет	После сыпи могут оставаться рубцы		Состояние значительно ан-рушено;лихорадка, интоксикация, общемозговая симптоматика	Инфекционно-токсический шок; Острая почечная недостаточность; суб-арахноидальное кровоизлияние; отек головного мозга; Параличи и парезы; эпилепсия.