

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК*



Диагностический признак	Острый гломерулонефрит	Смешанный тип нефротического синдрома	«Чистая» форма нефротического синдрома
Возраст	У более старших детей	Тоже у более старших детей	У 2–4-летних
Начало	Острое	Продолжение нефрита	Постепенное
Отеки	Преимущественно на лице	Тенденция к генерализации	Ярко выраженная генерализация
Моча:			
• альбумин;	Умеренное количество	Более значительное количество	Значительное количество
• осадок	Обилие; эритроциты, часто гранулированные цилиндры	Переменчиво; эритроциты, цилиндры	Цилиндры, включая восковые
Артериальное давление	Часто повышенное	Обычно повышенное	Нормальное
СОЭ	Ускоренная	Непостоянная	Ускоренная
Протеины сыворотки	Гипоальбуминемия, увеличение количества α_2 и γ -глобулинов	Гипоальбуминемия, увеличение количества α_2 и β -глобулинов	Гипоальбуминемия, увеличение количества α_2 и β -глобулинов, большое уменьшение γ -глобулинов
Азотемия	Редкая; умеренная	Умеренная до значительной	Отсутствует
Кровяные липиды	Уменьшение	Обычно умеренно повышенные	Повышение
Эстеры холестерина	Нормальное количество	Повышенное	Повышенное
Способность к концентрации	Сохраненная	Переменчивая	Нормальная

*по И. Андрееву, И. Вапцарову, Х. Михочву и соавт., 1977

Источник: Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней. - М.: 000 «Медицинское информационное агентство», 2011. - 600 с.