

Основные дифференциально-диагностические признаки различных вариантов atopической бронхиальной астмы



Дифференциально-диагностические клинические признаки	Варианты atopической бронхиальной астмы		
	пищевая	бытовая	сочетанная
Возраст начала заболевания	До 3 лет	5–7 лет и старше	До 3–5 лет
Возраст, в котором чаще всего встречается заболевание	До 3–6 лет	С 5–7 лет и старше	С 4–5 лет и старше
Этиологические факторы	Пищевые аллергены	Бытовые аллергены	Различные группы неинфекционных аллергенов
Особенности начала заболевания	Постепенное, обычно через стадию предастмы или астматического бронхита	Острое, сразу с типичных приступов экспираторного удушья	Постепенное, как и при пищевой астме
Продолжительность приступов	Несколько суток	Несколько часов	Несколько суток или недель
Частота приступов	Ежемесячно и чаще	2–4 раза в год	Ежедневно или еженедельно
Время суток, наиболее характерное для возникновения приступа	День	Ночь	День и ночь
Связь приступа с внешней обстановкой	Развивается в любом месте	Возникает только в домашних условиях	Развивается в любом месте
Эффективность бронхоспазмолитиков	Низкая, приступы полностью не купируются	Высокая, приступы полностью купируются	Частичная, приступы не всегда купируются
Сочетание с другими аллергическими заболеваниями	Атопический дерматит	Аллергический риносинусит	Атопический дерматит, аллергический риносинусит, лекарственная аллергия
Ведущая сопутствующая соматическая патология	Дисбактериоз кишечника, рецидивирующий бронхит, аденоиды	Типичной патологии нет	Рецидивирующий бронхит, аденоиды, дисбактериоз кишечника, заболевания ЖВП