

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СУБФЕБРИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ*



Дифференциально-диагностические признаки	Субфебрильные состояния	
	Субфебрилитет неинфекционный	Субфебрилитет инфекционный
Возраст	«Критические» периоды – грудной, 8–14 лет	В любом возрасте
Субъективные жалобы	Нарушение сна, потливость, утомляемость	Те же жалобы встречаются реже, доминируют головная боль, головокружение
Связь с перенесенными заболеваниями (ОРЗ, тонзиллит)	Отсутствует	Отмечается
Эффект от лечения антибиотиками	Отсутствует	Отмечается в момент лечения
Температурная кривая	Монотонность, разница между утренней и вечерней температурой невелика, нормализация во время сна	Изменения менее характерны; к вечеру с повышением
Симптомы и признаки астении	Как правило, положительны	Чаще отрицательны
Параклинические данные	Как правило, без изменений	Чаще не изменены

*по Н.П. Шабалову, 2000 с дополнениями.

Источник: Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. - 600 с.